

# Calendario de Vacunación de 2024

Del nacimiento a los 6 meses es posible que algunos bebés necesiten una dosis de la vacuna RSV.



**Al nacer**

**HepB**  
(hepatitis B)

Edad: **de 0 a 2 meses**

**DTaP**  
(difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**HepB**  
(hepatitis B) de 1 a 2 meses

**Hib**  
(meningitis por Hib)

**PCV**  
(neumonía)

**RV**  
(rotavirus)

Edad: **4 meses**

**DTaP**  
(difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**Hib**  
(meningitis por Hib)

**PCV**  
(neumonía)

**RV**  
(rotavirus)

Edad: **6 meses**

**DTaP**  
(difteria, tétanos y tos ferina)

**Polio**  
(IPV)

**HepB**  
(hepatitis B)

**PCV**  
(neumonía)

**RV**  
(rotavirus)

Edad: **12 meses**

**HepA**  
(Hepatitis A)

**MMR**  
(sarampión, paperas y rubéola)

**Hib**  
(meningitis por Hib)

**PCV**  
(neumonía)

**Varicela**  
(peste cristal)

Edad: **15 meses**

**DTaP**  
(difteria, tétanos y tos ferina)

Edad: **18 meses**

**HepA**  
(hepatitis A)

Edad: <b>4 a 6 años</b>	Edad: <b>11 a 12 años</b>	Edad: <b>16 a 18 años</b>
<b>DTaP</b> <b>Polio</b> (IPV) <b>MMR</b> <b>Varicela</b>	<b>Tdap</b> <b>VPH</b> (2 dosis) <b>MenACWY</b> (meningitis)	<b>MenACWY</b> (meningitis) <b>MenB</b>

Pregunte a su médico cuánto tiempo debe pasar entre cada vacuna. Para obtener más información, visite: [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines).

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los 6 meses de edad.

Proteja a su hijo contra la gripe. Todas las personas a partir de los 6 meses de edad deben vacunarse contra la gripe. Para proteger mejor a su hijo, vacúnelo contra la gripe durante la temporada de otoño.



**NIÑOS DE CALIFORNIA**  
Ámelos. Vacúnelos.