



Inicie Saludable Vacunas infantiles

EDADES DE VACUNACIÓN 2025



Los niños necesitan vacunas para protegerlos de enfermedades graves.

Durante el primer año, algunos bebés pueden necesitar una dosis contra el virus sincitial respiratorio (*Respiratory Syncytial Virus, RSV*). Hable con su médico para saber qué es lo mejor para su bebé.

La vacuna contra el COVID-19 se recomienda a partir de los seis meses de edad.

Mantenga a su hijo a salvo de la gripe. Todas las personas a partir de los seis meses de edad deben vacunarse contra la gripe. Para proteger mejor a su hijo, vacúnelo contra la gripe durante la temporada de otoño.



Edad 0 a 2 meses	Edad 4 meses	Edad 6 meses	Edad 12 meses
DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)	DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)	DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)	
Polio (IPV)	DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)	Polio (IPV)	HepA (hepatitis A)
HepB (hepatitis B) De 1 a 2 meses	Polio (IPV)	HepB (hepatitis B)	MMR (sarampión, paperas y rubéola)
Hib (meningitis por Hib)	Hib (meningitis por Hib)	Hib (meningitis por Hib)	Hib (meningitis por Hib)
PCV (neumonía)	PCV (neumonía)	PCV (neumonía)	PCV (neumonía)
HepB (hepatitis B)	RV (rotavirus)	RV (rotavirus)	RV (rotavirus)
Al nacer	RV (rotavirus)	RV (rotavirus)	Varicela (peste cristal)
		Edad 15 meses	Edad 18 meses
		DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)	HepA (hepatitis A)

Edad 4 a 6 AÑOS

DTaP
Polio (IPV)
MMR
Varicela

Edad 11 a 12 AÑOS

Tdap
HPV (2 dosis)
MenACWY (meningitis)

Edad 16 a 18 AÑOS

MenACWY (meningitis)
MenB (2 dosis)

Pregunte a su médico cuánto tiempo debe pasar entre una vacuna y otra. Para obtener más información, visite: www.cdc.gov/vaccines.



NIÑOS DE CALIFORNIA
Ámelos. Vacúnelos.