



Hágale a Su Hijo la Prueba de Detección de Plomo

POR QUÉ SU HIJO DEBE HACERSE LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE PLOMO

La intoxicación por plomo puede dificultar el aprendizaje, la atención o el comportamiento de su hijo y puede causar problemas de salud a largo plazo. Es posible que los niños no parezcan ni actúen como si estuvieran enfermos. La única forma de saber si hay plomo en el organismo de su hijo es hacerle una prueba para detectar la presencia de plomo.

Pídale al doctor de su hijo que haga una prueba de detección de plomo en sangre al año y a los dos años de edad si su hijo participa en un programa como **Medi-Cal, CHDP, WIC, Head Start u otros programas similares**. Si su hijo no está en uno de estos programas, pregúntele al doctor de su hijo sobre el riesgo de exposición al plomo que corre el niño.

EL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL PLOMO ES MAYOR ENTRE LOS NIÑOS QUE:

- **Viven** en una casa o edificio construido antes de 1978 o cerca de una fuente de emisiones atmosféricas de plomo, como autopistas, áreas industriales, aeropuertos de aviación general, lugares de reciclaje.
- Consumen o están en contacto con determinados alimentos, especias, remedios, vajillas u otros productos tradicionales.
- **Pasan tiempo** fuera de los Estados Unidos.
- **Tienen un hermano con** un nivel elevado de plomo en sangre.
- **Tienen un familiar que trabaja con plomo**, como en la construcción o la pintura, o tienen pasatiempos relacionados con el plomo, como vitrales, pesca, cerámica, armas de fuego o antigüedades.

Para obtener una lista de las fuentes de plomo, pregúntele a su doctor o visite:

<https://bit.ly/3SFK72S>

CHDP es el Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (*Child Health and Disability Prevention*)
WIC es el Programa de Suplementos Alimenticios para Mujeres, Bebés y Niños (*Women, Infant and Children*),

QUÉ ESPERAR: PRUEBA DE DETECCIÓN DE PLOMO EN SANGRE PARA SU HIJO



- 1 La prueba puede realizarse en el consultorio del doctor de su hijo o en un laboratorio.
- 2 Existen dos métodos de extracción de sangre para la prueba de detección de plomo: capilar o venoso. Las pruebas capilares suelen utilizar sangre extraída del dedo del niño. En los análisis venosos, se extrae sangre de una vena del brazo del niño.
- 3 Según el resultado, el doctor de su hijo puede solicitar otras pruebas. Las pruebas posteriores de detección de plomo en sangre deben ser por vía venosa.

Para obtener más información visite:
www.cdph.ca.gov/programs/clppb
o comuníquese con el Programa de Prevención de Intoxicación por Plomo para Niños:

