

Khởi Đầu Tốt Đẹp

Vắc-Xin Cho Trẻ Em

THỜI ĐIỂM CHỪNG NGỪA NĂM 2025



Trong năm đầu tiên, một số trẻ sơ sinh có thể cần một liều ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus, RSV). Hãy trao đổi với bác sĩ để xem loại nào phù hợp với con quý vị.

Nên tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Giữ con quý vị an toàn khỏi bệnh cúm.

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc-xin cúm. Để bảo vệ con quý vị một cách tốt nhất, hãy tiêm vắc-xin cúm cho trẻ vào mùa thu.



Trẻ em cần tiêm vắc-xin để được bảo vệ khỏi các bệnh nghiêm trọng.

Lúc Mới Sinh

HepB
(Viêm Gan B)

0-2 tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Polio
(IPV)

HepB
(Viêm Gan B)
1-2 tháng

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế Cầu Khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

4 tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Polio
(IPV)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế Cầu Khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

6 tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Polio
(IPV)

HepB
(Viêm Gan B)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế Cầu Khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

12 tháng tuổi

HepA
(Viêm Gan A)

MMR
(Sởi, Quai Bị và Rubella)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế Cầu Khuẩn)

Thủy Đậu
(Trái Rạ)

4-6 TUỔI

DTaP
(Bạch hầu, uốn ván, ho gà)
Bại liệt
(IPV)
MMR
Thủy đậu

11-12 TUỔI

Tdap
(Bạch hầu, uốn ván, ho gà)
HPV
(2 liều)
MenACWY
(Viêm màng não)

16-18 TUỔI

MenACWY
(Viêm màng não)
MenB
(2 liều)

Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị về khoảng thời gian cách nhau giữa các loại vắc-xin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.cdc.gov/vaccines.



TRẺ EM CALIFORNIA
Hãy yêu thương trẻ. Cho trẻ đi chủng ngừa.